

		SmofKabiven®	SmofKabiven®	SmofKabiven® EF	SmofKabiven® peripher	SmofKabiven® special	SmofKabiven® special EF	Aminomix® N 1
								
		Poches à 3 compartiments						Poches à 2 compartiments
Volumes		493 ml	986/*1477/**1970 ml	986/*1477 ml	1206/*1448 ml	1012/*1518 ml	1012/*1518 ml	1500 ml
Description		Soluté nutritif destiné à la nutrition parentérale avec des acides aminés (Aminoven®), du glucose, des lipides (SMOFlipid®) et des électrolytes	Soluté nutritif destiné à la nutrition parentérale avec des acides aminés (Aminoven®), du glucose, des lipides (SMOFlipid®) et des électrolytes	Soluté nutritif destiné à la nutrition parentérale avec des acides aminés (Aminoven®), du glucose, des lipides (SMOFlipid®), sans électrolytes	Soluté nutritif destiné à la nutrition parentérale avec des acides aminés (Aminoven®), du glucose, des lipides (SMOFlipid®) et des électrolytes pour une application par voie veineuse périphérique	Soluté nutritif destiné à la nutrition parentérale chez les patients en état critique avec des quantités adéquates des acides aminés (Aminoven®), du glucose, des lipides (SMOFlipid®) et des électrolytes	Soluté nutritif destiné à la nutrition parentérale chez les patients en état critique avec des quantités adéquates des acides aminés (Aminoven®), du glucose, des lipides (SMOFlipid®), sans électrolytes	Soluté nutritif destiné à la nutrition parentérale avec des acides aminés, du glucose et des électrolytes. Adjonction de lipides en cas de besoin possible
Composition	Glucose	63 g	125 g *187 g **250 g	125 g *187 g	85 g *103 g	86 g *129 g	86 g *129 g	300 g
	Acides aminés	25 g	50 g *75 g **100 g	50 g *75 g	38 g *46 g	66 g *99 g	66 g *99 g	75 g
	Lipides	19 g	38 g *56 g **75 g	38 g *56 g	34 g *41 g	29 g *44 g	29 g *44 g	-
	Azote	4 g	8 g *12 g **16 g	8 g *12 g	6.2 g *7.4 g	10.6 g *15.9 g	10.6 g *15.9 g	12 g
	Energie totale	550 kcal	1100 kcal *1600 kcal **2200 kcal	1100 kcal *1600 kcal	800 kcal *1000 kcal	900 kcal *1350 kcal	900 kcal *1350 kcal	1500 kcal
	Energie non-protéique	450 kcal	900 kcal *1300 kcal **1800 kcal	900 kcal *1300 kcal	700 kcal *800 kcal	635 kcal *952 kcal	635 kcal *952 kcal	1200 kcal
	pH	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.5 - 6.0
	Vitesse de perfusion/h max.	2 ml / kg	2 ml / kg	2 ml / kg	3 ml / kg	1.5 ml / kg KG	1.5 ml / kg KG	1.25 ml / kg
	Dose journalière max.	35 ml / kg	35 ml / kg	35 ml / kg	40 ml / kg	31 ml / kg KG	31 ml / kg KG	30 ml / kg
Informations de commande	Unité de commande	6	4	4	4	4	4	4
	N° d'article	831917200	831901200 *831902200 **831903200	831905200 *831906200	831911200 *831910720	833061200 *833079200	833020200 *833004220	K758681
	Pharmacode	5326077	4656016 *4656039 **4656045	5286780 *5286797	5416685 *5416691	7665665 *7665671	7674285 *7674291	4788924

[illegible]

Amninomix™ N1 : Solution aqueuse hydrochlorure de lysine, méthionine, phénylalanine, thréonine, tyrosine, valine, histidine, glycine sérine, lysine, taurine, alanine, proline, sodium de dihydrophosphate acide acétique (pH 8.85%), H2O2%, glucose NaCl, CaCl2, MgCl2, 1200-1000 ml contient au moins: 55 g glucose, 220 g / Solution de perfusion pour la nutrition parentérale Dose: 1000 ml par kg de pc. Vitesse de perfusion maximale: 125 ml / pc / PCH. Posologie maximale: 30 ml / pc / jour (jusqu'à 1000 kcal) Les patients diabétiques, réversibles, ou en sévère troubles du métabolisme de la glycémie, doivent être surveillés de près. Les patients atteints d'insuffisance rénale, de l'ordre de 3 mg, L'acidose La prudence est de rigueur chez les patients atteints d'insuffisance hépatique et rénale, hypomagnésémie, hyperkaliémie, acidose métabolique, comorbidité surajoutée et/ou acidose lactique. Contrôler régulièrement la glycémie de façon stricte et du bien hydrater. **A** Avoir une cure: **F** Frissons, nausées et vomissements, déséquilibre des acides aminés **E** Poches à deux compartiments de 1500 ml. Catégorie de vente B. Information professionnelle complète est publiée sur www.swissmedinfo.ch **D** Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Amn-Mattenhof 4, 6100 Kriens.

[illegible]

Amnoverin® 15% C Acides aminés D50/Lysosolue, Lysosolue monocaatéte de Lysine, L-méthionine, L-phénylalanine, L-thréonine, L-valine, arginine, L-histidine, alanine, glycine, L-proline, L-sérine, L-cystéine, taureau J Apport en acides aminés en tant que partie d'un régime nutritionnel parentéral 0,67 mg/ml (0,67 mg/ml PC) (e 10-20 g d'acides aminés/kg PC). Vitesse de perfusion maximale: 0,67 mg/kg PC/heure (e 0,1 g d'acides aminés/kg PC/heure) 0,1 g/kg maximal 133 ml/mg (e 20 g d'acides aminés/kg PC) Troubles du métabolisme des acides aminés et du métabolisme des électrolytes, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, hypertension non traitée, acidose métabolique, insuffisance cardiaque décompensée, enfants et adolescents de moins de 18 ans. MGP: Perfusion en cas d'hyperkaliémie et/ou d'hypernatrémie. Contrôler régulièrement le bilan hydrique, le bilan ionique et le bilan acido-basique. IA Aucune contre-indication. B Réactions allergiques. E Flacon de 500 ml. Catégorie de vente: B. Information professionnelle complète est publiée sur www.wissenswertmedinfo.ch. IA Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Amn Mithelhof 4, 6010 Kriens.

Aminovin® infant 10% C₆ acides aminés 100 g/kg Lyséoleucine, Leucine, Lysine, Méthionine, Phénylalanine, Threonine, Tyrosine, Valine, arginine, Histidine, acide ascorbique, lactate, L-proline, L-cystéine, thiamine, L-lysine, L-thréonine, L-alanine, malate / Nutrition parentérale partielles chez les prématurés, les nourissons et les enfants en bas âge jusqu'à 3 ans. Dose Prématuré : 25 g d'acides aminés/g PC correspond à env. 25 ml/kg PC / min. Infants : 15-25 g d'acides aminés/g PC correspondant à env. 15-25 ml/kg PC / min. 2-7 ans : 15 g d'acides aminés/g PC correspondant à env. 15 ml/kg PC / Troubles du métabolisme des acides aminés, choc, fonction rénale normale ou insuffisante, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, hyperphosphatémie, acidose métabolique, syndrome de l'hyperammonémie, MGK (catégorie de vert B de l'évaluation professionnelle) ; contre-indication : frangosisme sévère, des enzymes hépatiques, du taux des lipides (hors de l'utilisation de méfures lipidiques), du bilan hydrique et le cas échéant, des troubles des acides aminés sévères ainsi que du site de jonction (inflammation veineuse). /A Auccine courne / Frissons, nausées et vomissements avec partie rénale données, thrombose, acidose métabolique, hyperammonémie, E Flacons de 100 ml et 1000 ml. Catégorie de vert B de l'évaluation professionnelle; cette étude est publiée sur www.sswissmed.ch/de, TA Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Am Mettenhof 4, 6100 Kriens.

Dipeptiven® (Dipeptiven-Hydrolyat-L-Asparagine) (Dipeptiven®) est utilisé dans le cadre d'une alimentation parentérale en complément afin d'améliorer le bilan azoté lors d'éventuelles hypercatabolismes après des interventions chirurgicales. **Principes actifs** : 25 ml par jour et par kg de poids corporel. Dose maximale 25 ml par jour et par kg de PC. QHypersensibilité à l'asparagine et/ou à l'insuline requièrent une surveillance hépatique rigoureuse, adossement métabolique, surveillance des enfants. **MSP** : Précaution en cas de choc aigu, d'asthme, de troubles gastro-intestinaux graves, de diabète sucré, de décompensé d'infarctus du myocarde aigu, d'accident vasculaire cérébral, d'embole, d'acidose métabolique, de septicémie grave, de déshydratation hypotonique, de coma hyperosmolaire, d'insuffisance pulmonaire aiguë, d'hyperhydratation et d'insuffisance cardiaque décompensée. **Dipeptiven** ne doit pas être utilisé chez les patients présentant un choc préexistant ou une insuffisance du système cardiovasculaire, du système rénal ou du système de coagulation sanguine. Les enzymes hépatiques, la bilirubine, le bilan acido-basique, les électrolytes sériques, l'osmomolalité sérique et d'éventuels symptômes d'une hyperammonémie doivent être contrôlés. Le lactate urique est à surveiller. **Effets secondaires** : nausées, vomissements, élévation de la bilirubine, de la phosphatase alcaline, de GOT/GPT et de l'acide urique. **Précis de bases** : P-lacon de 200 mg/ml en 100 ml. Composition de vente B. Information professionnelle complète est publiée sur www.swissmedinfo.ch. **LA Fresenius Kabi (Schweiz) AG**, Am Mattenhof 4, 6100 Kriens.

Glycophosphat: Glycylphosphat (sodium pentahydrat) | Complément des solutions de perfusion dans l'alimentation parentérale chez l'adulte et l'enfant afin de couvrir le besoin en phosphate | Posologie individuelle en fonction du besoin en phosphate | Insuffisance rénale sévère, choc hypernatrémique, hypophosphatémie, déshydratation | **MP2** Ne pas utiliser si non dilué | Prudence chez les patients atteints d'insuffisance rénale | Contrôler régulièrement le statut des phosphates |

A Aucune connue | **A**ucun connu | **P** Ampoule de 20 mmol de glycérrophosphate / 40 mmol sodium par 20 mL | Catégo-
rie de vente B | Information pharmacologique complète est publiée sur www.swissmedinfo.ch | **A** Fresenius Kabi
(Schweiz) AG, Am Mettendorf 4, 6010 Kriens.

[illegible][illegible]

SmoKafé® : C'Alaine, une lysine glycine histidine leucine sélénine méthionine phénylalanine proline sérine thréonine tryptophane tyrosine valine chlorure de calcium chlorure d'érythro phosphate de sodium sulfate de magnésium chlorure de potassium acétate de sodium sulfite de zinc, glucose, huile de soja raffinée, triglycérides à chaîne moyenne, huile d'olive raffinée, huile de poisson. Pour une alimentation parentérale chez les patients adultes et les enfants âgés de 2 ans ou plus. EO dépend du effet diète des besoins et du poids corporel. Dose maximale 35 ml par jour et par site. Site principal actif EO dépend l'hydrophobie sérique, insuffisance hépatique sévère, troubles graves de la coagulation sérique, troubles congénitaux du métabolisme des acides aminés, insuffisance rénale sévère sans possibilité d'hémodiafiltration ou dialyse chronique, hypercalcémie non contrôlée, augmentation pathologique de la concentration sérique de phosphates électrolytes contenus dans la préparation. Chez les nouveau-nés les enfants en âge de moins de 2 ans, PR Prudence en cas d'insuffisance du métabolisme lipidique, des troubles de l'équilibre hydro-électrolytique, d'insuffisance rénale, d'acidose lactique, d'oxygénation cellulaire insuffisante, d'augmentation de la mortalité sérique, de rétention d'électrolyte. LA Insuline héparine dérivée de la coumarine. EO Légère augmentation de la température corporelle. Proche à tous compartiments de 493 ml, 586 ml, 1477 ml, 1970 ml. Catégorie de vert B. Information pharmacologique complète est publiée sur www.swissmedic.ch. La Presenius UK (Schweiz) AG, Am Mattenhof 4, 6101 Kriens.

SmofKefalen® EFG: **Al** Alanine, arginine, glycine, histidine, leucine, lysine, méthionine, phénylalanine, proline, sérine, thréonine, tyrosine, valine, glycine, glucose, huile de saumon raffinée. Triglycérides à chaîne moyenne, huile de palme, huile de poisson [Pour une alimentation parentérale chez les patients adultes et les enfants âgés de 2 ans ou plus].
Définition de l'état clinique, des besoins et du poids corporel. Dose maximale 35 ml par kg de P et par jour en administration continue centrale G.
Hypersensibilité aux protéines de poisson, d'œuf, de soja ou d'arachides ou à un autre principe actif externe. Hypertension sévère, insuffisance rénale sévère, troubles graves de la coagulation, signes graves de troubles congénitaux du métabolisme des acides aminés, insuffisance rénale sévère sans possibilité d'insufflation ou de dialyse, cholestase, insuffisance hépatique non cirrhotique. Chez les nouveau-nés et les enfants, dès l'âge de moins de 2 ans [5].
Prudence en cas d'insuffisance rénale, d'insuffisance hépatique, d'insuffisance cardiaque, d'insuffisance respiratoire, d'insuffisance du métabolisme lipidique, de troubles de l'équilibre hydrolytique, d'insuffisance rénale, d'acidose lactique, d'hyperglycémie, d'insuffisance cardiaque, d'augmentation de la tonalité musculaire, d'insuline, d'insuline dérivée de la catégorie II, d'agitation agitée, d'augmentation de la température corporelle P.
Poches à trois compartiments de 986 ml et 1477 ml. Catégorie de vertébre B. Uniformation professionnelle complète est publiée sur www.ssiem.fr/index.cfm.
T.A. Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Arm Mattenstr. 4, 6005 Kriens.

Smiles/Kabiven® peripheric © Allaine arginine, glycine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, méthionine, phénylalanine, proline, sérine, thréonine, tryptophane, tyrosine, valine. Chélate de calcium, glycérophosphate de sodium, sulfate de magnésium, sulfate de potassium, acétate de sodium, sulfate de zinc, glucose. Huile de safran raffiné, triglycérides à chaîne moyenne, huile d'olive raffinée, huile de poisson. Pour une alimentation parentérale chez les patients adultes et les enfants âgés de 2 ans et plus. **PO** Dépend de l'état clinique, des besoins et du poids corporel. Dose maximale 40 ml par kg de PC et par jour en administration veineuse dans une veine périphérique. **PO** hypersensibilité aux protéines de poisson, d'œuf ou de safran ou à d'autres produits à base d'œuf ou d'espèces de poissons. **PO** insuffisance rénale sévère, insuffisance hépatique sévère, troubles graves de la coagulation, troubles graves du métabolisme des électrolytes, diabète, insuffisance cardiaque sévère, saignement, cholestase, cholestérol élevé, cholestérol de l'œuf, choc allergique, métabolisme non contrôlé, augmentation prolongée de la concentration sérique des électrolytes contenus dans la préparation. Chez les nouveau-nés et les enfants en bas âge de moins de 2 ans, **PO** absence en cas d'insuffisance du métabolisme lipidique, de troubles de l'équilibre hydro-électrolytique, d'insuffisance rénale chronique latente, d'insuffisance cardiaque, d'insuffisance hépatique, d'augmentation de l'isomérisation sérique de l'électrolyte rétinol. **Prudence** chez les patients ayant un métabolisme hypercatabolique, ainsi que chez les patients présentant de mauvaises conditions veineuses périphériques. **IA** Insuline, héparine, dérivés de la coumarine. **II** Légère augmentation de la température corporelle, thrombocytopénie. **PO** Poche à trois compartiments de 1206 ml et 1448 ml. Augmentation de la vente. **B** Information pharmaceutique complète est publiée sur www.wissmedinfo.ch. **TA** Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Am Mattenhof 4, 6100 Prättigau, Suisse.

[illegible][illegible]

SMOFLIP® : Huile de soja, Huile d'olive, huile de poisson. Pour couvrir les besoins énergétiques et les besoins en acides gras essentiels, ainsi que pour la supplémentation en acides gras oméga 3 chez les patients dans le cadre de l'alimentation parentérale. **Adultes** : 10-20 g de lipides/kg/jour. **Enfants** et **adolescents** à partir de 6 ans : 3 g de lipides/kg/jour. **Nourrissons** : 4-6 g de lipides/kg/jour. **Contenance** : dose initiale 0,5-10 g de lipides/kg/jour suivie par une augmentation progressive jusqu'à 10 g de lipides/kg/jour. **Contenance** : 100 g. **Précautions d'emploi** : Contre-indiqué chez les patients souffrant d'une anémie sévère, d'insuffisance hépatique sévère, insuffisance hépatique sévère, troubles graves de la coagulation sanguine, insuffisance rénale sévère, hypersensibilité d'hypersensibilité sévère, troubles graves de la coagulation sanguine, insuffisance rénale sévère, sensibilité d'hypersensibilité ou de dialyse, choc aigu. **MCP** : Prudence en cas de métabolisme lipidique altéré, pré-éclampsie, diabète décompensé, pancréatite, fonction hépatique altérée, hypothyroïdisme (en cas d'hypothyroïdisme sévère), diabète sévère. **Prudence** : Prudence particulière chez les patients ayant un risque élevé d'hypersensibilité. **Prudence** : chez les nouveau-nés et les prématurés atteints d'hypertension ou d'hypertension pulmonaire. **4-Héparine** : Légère élévation de la température corporelle, frissons, maux de tête, nausées, vomissements. **Flacons** : 100 et 250 mL. **Catégorie de vente** : médicament professionnel. **Contenance** : 100 g. **Site web** : www.smoedif.com. **TA Fresenius Kabi (Schweiz) AG**, Am Matten 4, 6400 Kriens.

Solvant: N°1 Monoréacteur de thiamine (vit. B1), riboflavine phosphatée de sodium (vit. B2), chlorure de pyroxène (vit. B6), nicotinamide (vit. B3), pantothénate de sodium, nicotinamide bionine, acide folique, ascorbate de sodium (vit. C) [Composé dans le cadre de l'alimentation parentérale afin de couvrir les besoins physiologiques en vitamines hydrosolubles].
Adultes: Enfants de plus de 10 kg de PC à l'ampoule par jour. Enfants de moins de 10 kg: 10 mg d'ampoule/PC. **PC hypersensible à la vitamine C:** Les composants MCP ne doit pas être administré non dilué. **A** Phénylthio, **L** Dopas **B** Réactions allergiques, **P** 10 ampoules
 Catégorie de vente B. Information pharmacologique complète est publiée sur www.swissmedinfo.ch. **A** Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Untermythenstrasse 4, 6000 Kriens.

[illegible]

Les signes/noms avec ® sont des marques déposées du groupe Fresenius dans les pays sélectionnés.



FRESENIUS
KABI
caring for life

Fresenius Kabi (Schweiz) AG
Am Mattenhof 4, 6010 Kriens
www.fresenius-kabi.ch

Téléphone 041 552 70 00
InfoLine 800 800 877
InfoMail@fresenius-kabi.com



**FRESENIUS
KABI**
caring for life

Aperçu des produits

Nutrition parentérale

[illegible]

Emulsions lipidiques

Acides aminés

Additifs

		SMOFlipid®	Omegaven®	Aminoven® 10%	Aminoven® 15%	Aminoven® infant 10%	Dipeptiven®	Addaven®	Soluvit® N	Vitalipid® N Adult	Vitalipid® N Infant	Peditrace®	Glycophos®	
														
		Emulsions lipidiques		Standard		Spéciaux		'Détails par ampoule						
Volumes		100/*250 ml	100 ml	500 ml	250/*500 ml	100/*1000 ml	100 ml	10 ml	10 ml	10 ml	10 ml	10 ml	20 ml	Volumes
Description		Emulsion lipidique à base d'huile de soja, de TCM, d'huiles d'olive et de poisson; avec des acides gras ω-3 (EPA/DHA); pour les adultes et en pédiatrie	Emulsion lipidique à base d'huile de poisson, comme additif à teneur élevée en acides gras ω-3 (EPA/DHA)	Soluté d'acides aminés, sans électrolytes, avec de la taurine	Soluté d'acides aminés, sans électrolytes, avec de la taurine	Soluté d'acides aminés sans électrolytes, destiné à la nutrition parentérale en pédiatrie	Concentré de dipeptide alanyl-glutamine. 100 ml de Dipeptiven® contiennent 13.46 g de glutamine	Soluté d'oligo-éléments, complément de perfusion, destiné à la nutrition parentérale pour adultes	Vitamines hydro-solubles lyophilisées, complément de perfusion destiné à la nutrition parentérale pour adultes et en pédiatrie	Vitamines liposolubles, complément de perfusion destiné à la nutrition parentérale pour adultes	Vitamines liposolubles, complément de perfusion destiné à la nutrition parentérale en pédiatrie	Soluté d'oligoéléments, complément de perfusion, destiné à la nutrition parentérale en pédiatrie	Phosphate organique, complément de perfusion, destiné à la nutrition parentérale	Description
Composition		Energie totale 2000 kcal/l	Energie totale 1120 kcal/l	Energie totale 400 kcal/l	Energie totale 600 kcal/l	Energie totale 400 kcal/l	Energie totale 80 kcal/100 ml	Cuivre 380 µg	Vitamine B ₁ 2.5 mg	Vitamine A Palmitate de rétinol 990 µg	Vitamine A Palmitate de rétinol 690 µg	Cuivre 200 µg	Glycérophosphate 20 mmol	
		Huile de poisson 30 g/l EPA/DHA	Huile de poisson 100 g/l EPA/DHA	Acides aminés 100 g/l	Acides aminés 150 g/l	Acides aminés 100 g/l	Glutamine 13.46 g/100 ml	Manganèse 55 µg	Vitamine B ₂ 3.6 mg	Vitamine D ₂ Ergocalciférol 5 µg	Vitamine D ₂ Ergocalciférol 10 µg	Manganèse 10 µg	Sodium 40 mmol	
		Glycérol 25 g/l	Glycérol 25 g/l	Azote 16.2 g/l	Azote 25.7 g/l	Azote 14.9 g/l	Alanin 8.2 g/100 ml	Sélénium 79 µg	Vitamine B ₆ 4 mg	Vitamine E α-tocophérol 9.1 mg	Vitamine E α-tocophérol 6.4 mg	Sélénium 20 µg		
		Phospholipides d'œuf 12 g/l	Phospholipides d'œuf 12 g/l					Zinc 5 mg	Vitamine B ₁₂ 5 µg	Vitamine K ₁ Phytoménadione 150 µg	Vitamine K ₁ Phytoménadione 200 µg	Zinc 2.5 mg		
		Huile de soja 60 g/l						Fluor 950 µg	Acide pantothénique 15 mg			Fluor 570 µg		
		TCM 60 g/l						Iode 130 µg	Vitamine B ₃ 40 mg			Iode 9.85 µg		
		Huile d'olive 50 g/l						Chrome 10.0 µg	Biotine 60 µg					
		α-tocophérol 163-225 mg/l						Fer 1.1 mg	Acide folique 400 µg					
								Molybdène 19.0 µg	Vitamine C 100 mg					
pH							5.4-6.0	2.3-2.8	5.8	8	8	2	7.4	pH
Informations de commande	Unité de commande	10	10	10	10	10 *6	10	20	10	10	10	10	10	Unité de commande
	N° d'article	2678031 *2678061	1452031	3461091	3879061 *3460091	1475031 *1475141	1138031	ZYA1931	830976201	831008201	831016201	ZYV1981	ZYV1963	N° d'article
	Pharmacode	3327405 *3327411	2838888	2837877	6249479 *2837908	2837937 *4256392	2340740	6308503	1083040	1391988	1139711	1580229	2647303	Pharmacode

Grâce à des produits et des concepts novateurs en **nutrition clinique**, nous nous engageons tous les jours en faveur de **l'amélioration de la qualité de vie des patients en phase aiguë et des patients chroniques** hospitalisés, institutionnalisés ou traités à domicile.



Service HomeCare pour la nutrition clinique ambulatoire

La planification, l'organisation et la réalisation d'une nutrition clinique - parentérale ou entérale - ambulatoire, à domicile est un service gratuit proposé par le service HomeCare.

L'équipe FresuCare est composée de personnel infirmier diplômé avec des formations complémentaires (p. ex. soins intensifs, soins oncologiques) soutenu par des diététiciens et des professionnels de la pharmacie.

Le service FresuCare est reconnu par la SSNC et la SVK et répond aux directives de la SSNC pour les HomeCares.

► **Renseignements sur la nutrition clinique**
InfoLine (gratuit) 0800 800 877
InfoMail@fresenius-kabi.com

► **Pour votre commande**
Pour les hôpitaux, les cabinets médicaux et les pharmacies
Téléphone gratuit 0800 820 280
Téléfax 0800 820 281
customerservice.ch@fresenius-kabi.com

Horaires d'ouverture du lundi au vendredi
08h00 à 12h00 / 13h00 à 17h00

Pour les patients à domicile et les établissements médico-sociaux
Téléphone gratuit 0800 820 290
Téléfax 0800 820 291
homecare.ch@fresenius-kabi.com

Horaires d'ouverture du lundi au vendredi
07h45 à 17h30