

Composition	100 ml	200 ml
Valeur énergétique	435 kJ (104 kcal)	870 kJ (208 kcal)
Équivalent de pain	1,0 EP	2,0 EP
Protéines	4,9 g	9,8 g
Hydrates de carbone	11,7 g	23,4 g
dont :		
• sucre	8,3 g	16,6 g
• glucose	0,3 g	0,6 g
• fructose	-	-
• lactose	3,6 g	7,2 g
• isomaltulose	4,4 g	8,8 g
polysaccharides	3,1 g	6,2 g
• amidon	3,1 g	6,2 g
Graisses	3,8 g	7,6 g
dont :		
acides gras saturés	0,5 g	1,0 g
acides gras monoinsaturés	2,2 g	4,4 g
acides gras polyinsaturés	1,1 g	2,2 g
acides gras oméga-3		
• ALA	1,66 mg	332 mg
• EPA	22,4 mg	44,8 mg
• DHA	15,7 mg	31,4 mg
Fibres alimentaires	2,0 g	4,0 g
fibres alimentaires solubles ¹	1,7 g	3,4 g
fibres alimentaires insolubles ²	0,3 g	0,6 g
Eau	83 g	166 g

Apport énergétique : 18,8 % de protéines ; 32,6 % de lipides ; 44,8 % de glucides ;

3,8 % de fibres alimentaires

Osmolarité : 365 mOsmol/l

Osmolalité : 440 mOsmol/kg H₂O

Caractéristiques du produit

- normocalorique (1,0 kcal/ml)
- protéines du lait et de soja de haute valeur, sans caséine
- riche en acides gras monoinsaturés, en vitamine E et en antioxydants
- 1 arôme (vanille)

Indications

Carence alimentaire liée à une maladie, avant tout en cas :

- de diabète
- d'hyperglycémie



Diasip

Composition	100 ml	200 ml
Minéraux		
Sodium	55 mg	110 mg
Potassium	100 mg	200 mg
Chlore	45 mg	90 mg
Calcium	53 mg	106 mg
Phosphore	47 mg	94 mg
Magnésium	23 mg	46 mg
Oligo-éléments		
Fer	1,6 mg	3,2 mg
Zinc	1,2 mg	2,4 mg
Cuivre	180 µg	360 µg
Iode	13 µg	26 µg
Chrome	12 µg	24 µg
Fluor	0,10 mg	0,20 mg
Manganèse	0,33 mg	0,66 mg
Molybdène	10,0 µg	20,0 µg
Sélénium	7,5 µg	15 µg
Vitamines		
Vitamine A (RE)	82 µg	164 µg
Vitamine D ₃	1,2 µg	2,4 µg
Vitamine E (α-TE)	2,5 mg	5,0 mg
Vitamine K	5,3 µg	10,6 µg
Vitamine C	15 mg	30 mg
Vitamine B ₁	0,4 mg	0,8 mg
Vitamine B ₂	0,2 mg	0,4 mg
Niacine (NE)	1,8 mg	3,6 mg
Vitamine B ₆	0,3 mg	0,6 mg
Acide folique	38 µg	76 µg
Acide pantothénique	0,8 mg	1,6 mg
Vitamine B ₁₂	0,65 µg	1,3 µg
Biotine	6,5 µg	13,0 µg
Autres ingrédients		
Choline	50 mg	100 mg
Caroténoïde	0,20 mg	0,40 mg

Ingrédients (variante vanille)

Eau, isomaltulose*, fibres alimentaires (galacto-oligosaccharide (du lait de vache), dextrine résistante, amidon résistant, cellulose), huiles végétales, colza, tournesol), amidon (tapioca), sucre de lait (lactose), concentré de lactosérum (du lait), isolat de protéines de soja, arôme (vanille), acidifiant (acide citrique), huile de poisson, citrate tricalcique, chlorure de choline, caroténoïdes (contient du soja, du β-carotène, de la lutéine, du lycopène), hydroxyde de magnésium, phosphate dipotassique, hydroxyde de potassium, L-ascorbate de sodium, colorant (curcumine), chlorure de calcium, citrate de sodium, phosphate tricalcique, stabilisateur (carraghénane), édulcorants (acésulfame K, saccharine de sodium), lactate ferreux, acétate de DL-α tocophérol, carbonate de calcium, sulfate de zinc, nicotinamide, acétate de rétinol, gluconate de cuivre, D-pantothénate de calcium, chlorure de chrome, sulfate de manganèse, sélénite de sodium, D-biotine, chlorhydrate de thiamine, cyanocobalamine, cholestérol, chlorhydrate de pyridoxine, acide ptéoylmonoglutamique, riboflavine, molybdate de sodium, iodure de potassium, fluorure de sodium, phytoménadione.

* l'isomaltulose est une source de fructose et de glucose

Quantité journalière recommandée

Comme seule source d'alimentation :

5 – 7 bouteilles/jour

Comme complément :

1 – 3 bouteilles/jour

Contre-indications

Diasip ne doit pas être utilisé si un apport alimentaire médical par voie entérale est en général interdit ou s'il existe une intolérance à l'une des substances contenues.

Pas indiqué chez les enfants en-dessous de 3 ans.

Utiliser avec des précautions particulières chez les enfants entre 3 et 6 ans.

Pas indiqué chez les patients qui nécessitent une diète sans fibres alimentaires ou chez les patients présentant une fructosemie ou une galactosémie.