

Maltodextrin 6

Composition		100 g	12,5 g*
Valeur énergétique	1647 kJ (388 kcal)	8,1 EP	206 kJ (49 kcal)
Équivalent de pain	0 g	0 g	0 g
Protéines	96,9 g	12,1 g	0 g
Hydrates de carbone			
dont :			
sucre	1,3 g	0,16 g	0 g
• glucose	0,3 g	0,04 g	0 g
• maltose	1 g	0,13 g	0 g
• saccharose	1,3 g	0,16 g	0 g
Graisses	0 g	0 g	0 g
Fibres alimentaires	0 g	0 g	0 g
Eau			
sodium	< 1,5 mg	< 0,2 mg	

* 1 mesurette

Ingrédient

Maltodextrine (d'amidon de maïs)



Caractéristiques du produit

- poudre instantanée d'hydrates de carbone pour un apport énergétique
- résorption complète
- n'édulcore pas/gout neutre
- faible osmolalité et, ainsi, bien toléré**
- pour enrichir les boissons et les repas épicés et doux

Indications

Forte carence alimentaire ou besoin en énergie élevé lié à une maladie, avant tout en cas :

- de tumeurs, d'infections VIH
- d'insuffisance rénale chronique
- de syndrome de malabsorption
- de maladies du tractus gastro-intestinal

Contre-indications

Maltodextrin 6 ne doit pas être utilisé si un apport alimentaire médical par voie entérale est en général interdit ou s'il existe une intolérance à l'une des substances contenues.

Maltodextrin 19

Composition		100 g	12,5 g*
Valeur énergétique	1632 kJ (384 kcal)	8 EP	204 kJ (48 kcal)
Équivalent de pain	0 g	0 g	0 g
Protéines	96 g	12,0 g	0 g
Hydrates de carbone			
dont :			
sucre	7,6 g	1,0 g	0 g
• glucose	3,8 g	0,48 g	0 g
• maltose	0,7 g	0,09 g	0 g
• saccharose	7,6 g	0,95 g	0 g
Graisses	0 g	0 g	0 g
Fibres alimentaires	0 g	0 g	0 g
Eau			
sodium	< 1,5 mg	< 0,2 mg	

* 1 mesurette

Ingrédient

Maltodextrine (d'amidon de maïs)



Caractéristiques du produit

- poudre instantanée d'hydrates de carbone pour un apport énergétique
- résorption complète
- légèrement sucré/sinon, goût neutre
- à base d'amidon de maïs
- pour enrichir les boissons et les repas épicés et doux

Indications

Fort carence alimentaire ou besoin en énergie élevé lié à une maladie, avant tout en cas :

- de tumeurs, d'infections VIH
- d'insuffisance rénale chronique
- de syndrome de malabsorption
- de maladies du tractus gastro-intestinal

Contre-indications

Maltodextrin 19 ne doit pas être utilisé si un apport alimentaire médical par voie entérale est en général interdit ou s'il existe une intolérance à l'une des substances contenues.