

NOUVEAU

Glucerna[®]
ADVANCE
1.6 kcal


LE PREMIER SUPPLÉMENT
NUTRITIF ORAL SPÉCIFIQUE
AU DIABÈTE[†] AVEC HMB* –
SOUTIENT LE CONTRÔLE GLYCÉMIQUE
ET LA SANTÉ MUSCULAIRE¹⁻¹⁶



[†]Pour les patients atteints de diabète en cas de malnutrition avérée (ou éventuelle) liée à la maladie.

*HMB: B-hydroxy-B-méthylbutyrate

 Abbott



POUR LES PATIENTS ATTEINTS DE DIABÈTE OU PRÉSENTANT UN MÉTABOLISME ANORMAL DU GLUCOSE EN CAS DE MALNUTRITION AVÉRÉE (OU ÉVENTUELLE) LIÉE À LA MALADIE

AMÉLIORE LE CONTRÔLE GLYCÉMIQUE¹⁻¹⁰

CONTRIBUE À LA SANTÉ MUSCULAIRE¹¹⁻¹⁶



3 ARÔMES RAFFINÉS

PAR BOUTEILLE

AVEC
HMB
LYSINE
ARGININE

220 ml

355 kcal

18,3 g Protéines

4,2 g Fibres

Glucides à absorption lente

INDICATIONS

Pour les besoins nutritionnels des patients atteints de diabète ou présentant un métabolisme anormal du glucose en cas de malnutrition avérée ou éventuelle liée à la maladie.

Valeurs nutritionnelles	100 ml	220 ml
P/G/L (En%)	21/30/46	
Énergie (kJ/kcal)	675/161	1484/355
Protéines (g)	8,32	18,30
- dont arginine	0,61	1,3
- dont lysine	0,99	2,2
CaHMB** (g)	0,35	0,77
- dont HMB*	0,26	0,57
Leucine	0,72	1,58
Glucides (g)	12,75	28,05
- dont sucres	6,70	14,74
- dont polyols	1,20	2,64
Lipides (g)	8,28	18,22
- dont acides gras saturés	0,70	1,5
Fibres alimentaires (g)	1,9	4,2
- dont FOS***	1,0	2,2
Sel (g)	0,35	0,77
Lactose (max., mg)	23	51
Sans gluten		✓

ARÔMES

Vanille (20059988; PC 11 16 373)
Fraise (20059990; PC 11 16 374)
Café (20059989; PC 11 16 375)

Unité: 24x 220ml

Minéraux	100 ml	220 ml
Sodium (mg)	140	308
Potassium (mg)	165	363
Chloride (mg)	123	271
Calcium (mg)	123	271
Phosphore (mg)	88	194
Magnésium (mg)	26	57
Fer (mg)	1,2	2,6
Zinc (mg)	1,7	3,7
Cuivre (mg)	0,11	0,23
Manganèse (mg)	0,44	0,97
Iode (µg)	15	33
Molybdène (µg)	16	35
Chrome (µg)	8,4	19
Sélénium (µg)	9,5	21
Osmolarité (mOsm/l)		704
Choline (mg)	60	132
Taurine (mg)	15	33
Carnitine (mg)	12	26
Inositol (mg)	85	187
Vitamines	100 ml	220 ml
Vit. A-Palmitate (µg RE)	144	317
Vit. D ₃ (µg)	3,2	7,0
Vit. E (mg-α TE)	3,0	6,6
Vit. K ₁ (µg)	12	26
Vit. C (mg)	13	29
Vit. B ₁ (mg)	0,26	0,57
Vit. B ₂ (mg)	0,34	0,75
Vit. B ₆ (mg)	0,39	0,86
Vit. B ₁₂ (µg)	0,50	1,1
Nicotinamide (mg NE)	3,0	6,6
Acide folique (µg)	40	88
Biotine (µg)	7,2	16
Acide pantothénique (mg)	1,2	2,6

*HMB: 6-hydroxy-β-méthylbutyrate; Prot: Protéine; Arg: Arginine; Lys: Lysine; **CaHMB: Calcium-6-hydroxy-β-méthylbutyrate; ***FOS: Fructo-oligosaccharides
1. Fix BM; Lowe W; Cockram LD. Seventeenth International Congress of Nutrition. 2001. 2. Fibersol-2: A soluble, non-digestible, starch-derived dietary fibre. In: McCleary B, Prosky L, eds. Advanced Dietary Fibre Technology. Oxford, UK: Blackwell Science; 2001:509-523. 3. Grynsman A C, Wolever TM, Eur J Clin Nutr. 2008;62:1364-1371. 4. Mirmiranpour, H. et al., Acta medica Iranica, 2016;54(1), 24-31. 5. Mirmiranpour, H. et al., Thrombosis research, 2012;130(3), e13-e19. 6. Sulochana KN et al., Glycoconj J 18, 277-282 (2001). 7. Boon M R et al. Diabetologia, 2019;62(1), 112-122. 8. Monti L.D., Galluccio, E., Villa, V. et al. Eur J Nutr 57, 2805-2817 (2018). 9. Monti L.D. et al. 201 Diabetes, obesity & metabolism, 2012;14(10), 892-900. 10. Pietri P.M. et al., Diabetes care, 2015; 38(5), 875-880. 11. Fikolli, P. et al. Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.), 2004; 20(5), 445-451. 12. Baier, S. et al., JPEN, Journal of parenteral and enteral nutrition, 2009; 33(1), 71-82. 13. Fuller, J. C. et al., JPEN, Journal of parenteral and enteral nutrition, 2011;35(6), 757-762. 14. Chew, S. T. H. et al., Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland), 2021;40(4), 1879-1892. 15. Berton, L. et al. PloS one, 2015;10(11), e0141757. 16. Oliveira, G. et al., Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland), 2016;35(5), 1015-1022.



EN
SAVOIR
PLUS ICI

Abbott AG
Hotline 0800 88 80 81
www.nutrition.abbott.ch

