

Poches à plusieurs compartiments

		SmofKabiven®	SmofKabiven®	SmofKabiven® EF	SmofKabiven® peripher	SmofKabiven® special	SmofKabiven® special EF	Aminomix® N 1
								
		Poches à 3 compartiments						Poches à 2 compartiments
	Volumes	493 ml	986/*1477/**1970 ml	986/*1477 ml	1206/*1448 ml	1012/*1518 ml	1012/*1518 ml	1000/*1500 ml
Description		Soluté nutritif destiné à la nutrition parentérale avec des acides aminés (Aminoven®), du glucose, des lipides (SMOFlipid®) et des électrolytes	Soluté nutritif destiné à la nutrition parentérale avec des acides aminés (Aminoven®), du glucose, des lipides (SMOFlipid®) et des électrolytes	Soluté nutritif destiné à la nutrition parentérale avec des acides aminés (Aminoven®), du glucose, des lipides (SMOFlipid®), sans électrolytes	Soluté nutritif destiné à la nutrition parentérale avec des acides aminés (Aminoven®), du glucose, des lipides (SMOFlipid®) et des électrolytes pour une application par voie veineuse périphérique	Soluté nutritif destiné à la nutrition parentérale chez les patients en état critique avec des quantités adéquates des acides aminés (Aminoven®), du glucose, des lipides (SMOFlipid®) et des électrolytes	Soluté nutritif destiné à la nutrition parentérale chez les patients en état critique avec des quantités adéquates des acides aminés (Aminoven®), du glucose, des lipides (SMOFlipid®), sans électrolytes	Soluté nutritif destiné à la nutrition parentérale avec des acides aminés, du glucose et des électrolytes. Adjonction de lipides en cas de besoin possible
Composition	Glucose	63 g	125 g *187 g **250 g	125 g *187 g	85 g *103 g	86 g *129 g	86 g *129 g	300 g
	Acides aminés	25 g	50 g *75 g **100 g	50 g *75 g	38 g *46 g	66 g *99 g	66 g *99 g	75 g
	Lipides	19 g	38 g *56 g **75 g	38 g *56 g	34 g *41 g	29 g *44 g	29 g *44 g	-
	Azote	4 g	8 g *12 g **16 g	8 g *12 g	6.2 g *7.4 g	10.6 g *15.9 g	10.6 g *15.9 g	12 g
	Energie totale	550 kcal	1100 kcal *1600 kcal **2200 kcal	1100 kcal *1600 kcal	800 kcal *1000 kcal	900 kcal *1350 kcal	900 kcal *1350 kcal	1500 kcal
	Energie non-protéique	450 kcal	900 kcal *1300 kcal **1800 kcal	900 kcal *1300 kcal	700 kcal *800 kcal	635 kcal *952 kcal	635 kcal *952 kcal	1200 kcal
	pH	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.5 - 6.0
	Vitesse de perfusion/h max.	2 ml / kg	2 ml / kg	2 ml / kg	3 ml / kg	1.5 ml / kg KG	1.5 ml / kg KG	1.25 ml / kg
	Dose journalière max.	35 ml / kg	35 ml / kg	35 ml / kg	40 ml / kg	31 ml / kg KG	31 ml / kg KG	30 ml / kg
Informations de commande	Unité de commande	6	4	4	4	4	4	4
	N° d'article	831917200	831901200 *831902200 **831903200	831905200 *831906200	831911200 *831910720	833061200 *833079200	833020200 *833004220	K758681
	Pharmacode	5326077	4656016 *4656039 **4656045	5286780 *5286797	5416685 *5416691	7665665 *7665671	7674285 *7674291	4788924

[illegible]

Ammonium Nitrate : EC : leucine, leucine, hydrochlorure de lysine, méthionine, phénylalanine, thréonine, tyrosine, valine, arginine, histidine, glycine, sérine, tyrosine, leucine, alanine, proline, sodium de glycérophosphate, acide caproïque, HO-KH₂PO₄, HO-25% glucose, NaCl, CaCl₂, MgCl₂, ZnCl₂, 100 ml contient : additifs : 55 g de glucose, 220 g de PC. Volume de perfusion pour la nutrition parentérale EC : Dose journalière : 20 ml par kg de PC. Vitesse de perfusion maximale : 125 ml par kg / PC/h. Posologie maximale : 30 ml par kg de PC/h. Lésions hépatiques réversibles, urémie sévère, troubles du métabolisme du calcium, hyperphosphatémie, hypocalcémie, hypomagnésémie, hypomagnésémie, hypomagnésémie, hypomagnésémie de 3 ans, MGP. La prudence est de rigueur chez les patients atteints d'insuffisance hépatique et rénale, l'hyperphosphatémie, l'hypercalcémie, l'acidose métabolique, l'oméprazole sévère, l'acide et l'acide lactique. Contrôle régulier du glycémie, de l'ionogramme sérique et du bilan hydrique. LA : Aucune contre-é. F : Risques nausées et vomissements, déséquilibre des électrolytes. E : Poches à deux compartiments de 1000 ml et 500 ml. Capacité de vertèbre B. Information professionnelle complète est publiée sur www.swissmedinfo.ch. LA : Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Am Mattenhof 4, 6000 Kriens.

Aminoverin® 10% Gd Acides aminés 50g/L : isoleucine, leucine, monométhylate de Lysine, L-méthionine, phénylalanine, thréonine, tryptophane, valine, arginine, L-thréonine, alanine, glycine, proline, L-isoleucine, tauroine | Ephédrine | Acides aminés en tant que partie d'un régime nutritionnel parental | Doseologie jugulaire: 6-73/3 ml/kg PCw 10-20 g acides aminés /kg PCw | Vitesse de perfusion maximale: 0,8 ml/kg PCheure (= 0,15 g/dl acides aminés/kg PCheure) | Précautions: l'hypernatrémie sévère (Na^+ > 16 mmol/l) peut entraîner des convulsions et la mort | Troubles du métabolisme des acides aminés, choc hypotensif, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, troubles du métabolisme du sucre, insuffisance électrolytique, aversion/hypotonie non traitée, acidose métabolique, insuffisance cardiaque chez les nourrissons et adolescents de moins de 18 ans | MGP Prudence en cas d'hypokaliémie et/ou d'hyponatrémie | Contrôler régulièrement le bilan hydrique, le bilan ionique et le bilan acido-basique | A Acurone connue | Réactions allergiques | Flacon de 500 mL Catégorie de vente B | Information pharmacologique complète est publiée sur www.ssmssmedinfach.at | Presenius Kabi (Schweiz) AG, Am Mattenhof 4, 6010 Kriens.

SmeßKabinen® special Gd Alanine, arginine, glycine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, méthionine, phénylalanine, proline, sérine, threonine, tryptophane, valine, arginine, L-thréonine, alanine, glycine, proline, L-isoleucine, tauroine | Ephédrine | Acides aminés en tant que partie d'un régime nutritionnel parental | Doseologie jugulaire: 6-73/3 ml/kg PCw 10-20 g acides aminés /kg PCw | Vitesse de perfusion maximale: 0,8 ml/kg PCheure (= 0,15 g/dl acides aminés/kg PCheure) | Précautions: l'hypernatrémie sévère (Na^+ > 16 mmol/l) peut entraîner des convulsions et la mort | Troubles du métabolisme des acides aminés, choc hypotensif, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, troubles du métabolisme du sucre, insuffisance électrolytique, aversion/hypotonie non traitée, acidose métabolique, insuffisance cardiaque chez les nourrissons et adolescents de moins de 18 ans | MGP Prudence en cas d'hypokaliémie et/ou d'hyponatrémie | Contrôler régulièrement le bilan hydrique, le bilan ionique et le bilan acido-basique | A Acurone connue | Réactions allergiques | Flacon de 500 mL Catégorie de vente B | Information pharmacologique complète est publiée sur www.ssmssmedinfach.at | Presenius Kabi (Schweiz) AG, Am Mattenhof 4, 6010 Kriens.

Amivone® 15% (g) Acides aminés 150 g/L : Lysine, Leucine, Alanine, monométhylate de Lysine, L-méthionine, L-phénylalanine, L-thréonine, L-thryptophane, L-valine, arginine, L-alanine, glycine, L-proline, L-sérine, L-thionine, taureau ; L'apport en acides aminés en tant que partie du régime nutritionnel parentéral ; Dosologie jugulaire : 6,7/33 ml/kg (à 10-20 g d'acides aminés/kg PC) ; Vitesse de perfusion maximale : 0,67 ml/kg PC/heure (à 33 g d'acides aminés/kg PC/heure) ; Dose maximale : 150 g/kg (à 20 g d'acides aminés/kg PC) ; Troubles du métabolisme : des acides aminés ; Contre-indication : insuffisance rénale sévère sans possibilité d'hémodialyse ou de dialyse, choc, hyperglycémie non contrôlée, augmentation pathologique de la concentration sérique de tous les électrolytes contenus dans la préparation ; Précautions : en cas de dysfonction du métabolisme spécifique de troubles de l'équilibre hydroélectrolytique, insuffisance rénale, diarrhée, dysfonction coagulationnelle ; Indications : augmentation de l'osmolarité sérique, de rétention électrolytique, pas être administré en même temps que des produits sanguins, pas indiquer chez les nouveau-nés et les enfants en bas âge de moins de 2 ans ; L'insuline héparine dérivée de la vache ; Augmentation de la température corporelle ; Poche et

[illegible]

Dipeptiven® (C₁₂N₂-Lysyl-L-glutamine, Dipeptiven®) est utilisé dans le cadre d'une alimentation parentérale en complément afin d'améliorer le bilan azoté lors d'états métaboliques hypercataboliques après des interventions chirurgicales. **TA** Presenius Kabi (Schweiz) AG, Am Mattenhof 4, 6100 Kriens.

SMOFipid® (C₁₂ huile de poisson, SMOFipid®) est utilisé pour couvrir les besoins énergétiques et les besoins en acides essentiels, ainsi que pour la supplémentation en acides gras oméga-3 chez les patients dans le cadre de l'alimentation parentérale. **TA** Presenius Kabi (Schweiz) AG, Am Mattenhof 4, 6100 Kriens.

SMOFipid® (C₁₂ huile de poisson, SMOFipid®) est utilisé pour couvrir les besoins énergétiques et les besoins en acides essentiels, ainsi que pour la supplémentation en acides gras oméga-3 chez les patients dans le cadre de l'alimentation parentérale. **TA** Presenius Kabi (Schweiz) AG, Am Mattenhof 4, 6100 Kriens.

Glycophos® C (Glycérophosphate de sodium pentahydraté) Complément des sels minéraux de perfusion dans l'alimentation parentérale chez l'adulte et l'enfant ainsi que de couvrir le besoin en phosphate. P Solucio individual en funcio del necesari en fosforat. C Insuficiència renal severa, cholestera, hiperparatiroidisme, deshidratació. N No es pot utilitzar en solució. P Prudència: que els pacients afectats d'insuficiència renal Controli regularment el nivell de fosfats. A Aucune connue. A Aucun connu. A Ampoule de 20 mmol de glycérophosphate / 40 mmol sodium par 20 mL. Catégorie de vente B. Information professionnelle complète est publiée sur www.swissmedinfo.ch. F Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Am Mattenhof 4, 6010 Kriens.	Solvit® N C Mononitrate de thiamine (vit. B₁), riboflavine phosphate de sodium (vit. B₂), chlorure de pyridoxine (vit. B₆), cyanocobalamine (vit. B₁₂), pantothénate de sodium, nicotinamide, biotine, acide folique, ascorbate de sodium (vit. C). C Adultes dans le cadre de l'alimentation parentérale afin de couvrir les besoins journaliers en vitamines hydrosolubles. N Enfants et enfants plus de 10 kg de PC. A ampoule par jour. Enfants de moins de 10 kg: 10/100 ampoule/kg PC. P Hyperensibilité à des composants. M Ne doit pas être administré non dilué. A Phénylène, L-Dopa. R Réactions allergiques. N 10 ampoules. Catégorie de vente B. Information professionnelle complète est publiée sur www.swissmedinfo.ch. F Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Am Mattenhof 4, 6010 Kriens.
--	--

[illegible]

Pediatric® = Chlorure de zinc, chlorure de cuivre (Zn+Cu), chlorure de manganèse (MnO), sélénite de persulfate anhydre, fluoreur de sodium, iodure de potassium | Concentré d'oligo-éléments comme supplément de perfusion dans l'alimentation pédiatrique et en nutrition parentérale B | Nourishment et équilibre des oligo-éléments jusqu'à 15 kg / ml / mg par jour enfant en âge de plus de 15 ans / ml / mg par jour adulte | Valérie de Wilton, LA22 Pudeleur, France | Valérie de Wilton, LA22 Pudeleur, France, en particulier en cas de déficience hépatique cholestasique hépato-cholestasique ou d'insuffisance rénale chronique | En cas de traitement d'une durée de plus de 4 semaines, le taux plasmatique des différents oligo-éléments, en particulier le taux de manganèse, doit être contrôlé A | Aucune connue E | Thrombophlébite superficielle, réactions allergiques E | Ampoule de 10 ml Catégorie de vente B | Information professionnelle complète est publiée sur www.swissmedinfo.ch, TA Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Am Mattenhof 4, 6700 Kriens.

SmofKabiven® : G. Alanine, arginine, glycine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, méthionine, phénylalanine, proline, sérine, taurine, thréonine, tryptophane, tyrosine, valine, chlorure de calcium, glycérophosphate de sodium, sulfate de magnésium, chlorure de potassium, acétate de sodium, sulfate de zinc, glucose, huile de soja raffinée, triglycérides à chaîne moyenne, huile d'olive raffinée, huile de poisson.) Pour une alimentation parentérale chez les patients adultes et les enfants âgés de 2 ans ou plus. **PR** Dépend du état clinique des besoins et du poids corporel. Dose maximale 35ml par kg de PC et par jour, administrée en 2 ou 3 perfusions. Contre-indications : aux protéines de poisson, d'œuf, de soja ou d'arachides ou à un autre principe actif ou excipient. Hypertension sévère, insuffisance hépatique sévère, troubles graves de la coagulation sanguine, troubles congénitaux du métabolisme des acides aminés, insuffisance rénale sévère sans possibilité d'hémodialyse ou de dialyse, choc aigu, hyperglycémie non contrôlée, augmentation pathologique de la concentration sérique de l'urée, des électrolytes contenus dans la préparation. Chez les nouveau-nés et les enfants en bas âge de moins de 2 ans, **PR** Prudence en cas de insuffisance du métabolisme lipidique, de troubles de l'équilibre hydro-électrolytique, de insuffisance rénale, d'acidose lactique, d'ovogénation cellulaire insuffisante, d'augmentation de l'osmomolalité sérique, de rétention électrolytique. **LA** Insuline, héparine, dérivés de la coumarine. **E** Légère augmentation de la température corporelle. **P** Poche à trois compartiments de 493 ml, 986 ml, 1477 ml, 1970 ml. Catégorie de vente B. L'information professionnelle complète est publiée sur www.wissmedinfo.ch. **LA** Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Am Mattenhof 4, 6100 Kriens.

SmofKefalen® EFG: Alanine, arginine, glycine, histidine, leucine, lysine, méthionine, phénylalanine, proline, sérine, thréonine, tyrosine, valine, glucose, huile de saumon raffinée, triglycérides à chaîne moyenne, huile de palme, huile de poisson ! Pour une alimentation parentérale chez les patients adultes et les enfants âgés de 2 ans ou plus. Définition de l'état clinique, des besoins et du poids corporel. Dose maximale 35 ml par kg et par jour, en administration continue centrale G. Hypersensibilité aux protéines de poisson, d'œuf, de soja ou d'arachides ou à un autre principe actif suspecté. Hypertension sévère, insuffisance rénale sévère, troubles graves de la coagulation, signes graves de troubles congénitaux du métabolisme des acides aminés, insuffisance rénale sévère sans possibilité d'insufflation ou de dialyse, cholestase, insuffisance hépatocellulaire. Chez les nouveau-nés et les enfants, dès l'âge de moins de 2 ans : [5] Prudence en cas d'insuffisance du métabolisme lipidique, de troubles de l'équilibre hydrolytique, d'insuffisance rénale, d'acidose lactique, d'hyperglycémie, d'insuffisance cardiaque, d'augmentation de l'osmolarité sérique. La insuline, l'insuline dérivée de la catégorie II, l'aglycose augmentent de la température corporelle P. Poche à trois compartiments de 986 ml et 1477 ml. Catégorie de verté B. L'information professionnelle complète est publiée sur www.ssiwfmedien.de. TA Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Arm Mattenstr. 4, 6005 Kriens.

Smiles/Kabiven® peripheric © Allenne arginine, glycine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, méthionine, phénylalanine, proline, sérine, threonine, tryptophane, tyrosine, valine. Chélate de calcium, glycérophosphate de sodium, sulfate de magnésium, sulfate de potassium, acétate de sodium, sulfate de zinc, glycérol, huile de safran raffiné, triglycérides à chaîne moyenne, huile d'olive raffinée, huile de poisson. Pour une alimentation parentérale chez les patients adultes et les enfants âgés de 2 ans et plus. **PO** Dépend de l'état clinique, des besoins et du poids corporel. Dose maximale 40 ml par kg de PC et par jour en administration veineuse dans une veine périphérique. **PO** hypersensibilité aux protéines de poisson, d'œuf ou à d'autres produits, à d'autres principes actifs ou excipients. **PO** insuffisance rénale sévère, insuffisance hépatique sévère, troubles graves de la coagulation, troubles graves du métabolisme des électrolytes, diabète, insuffisance cardiaque sévère, saignement, cholestase, cholestérol élevé, cholestérol de l'œuf, choc allergique, métabolisme non contrôlé, augmentation pathologique de la concentration sérique des électrolytes contenus dans la préparation. Chez les nouveau-nés et les enfants en bas âge de moins de 2 ans, **PO** absence en cas d'insuffisance du métabolisme lipidique, de troubles de l'équilibre hydro-électrolytique, d'insuffisance rénale chronique latente, d'insuffisance cardiaque, d'insuffisance hépatique, d'augmentation de l'isomérisation sérique de l'électrolyte rétinol. **Prudence** chez les patients ayant un métabolisme hypercatabolique, ainsi que chez les patients présentant de mauvaises conditions veineuses périphériques. **IA** Insuline, héparine, dérivés de la coumarine. **II** Légère augmentation de la température corporelle, thrombocytopénie. **PO** poche à trois compartiments de 1206 ml et 1448 ml. Augmentation de la vente. **B** Information pharmaceutique complète est publiée sur www.wissmedinfo.ch. **TA** Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Am Mattenhof 4, 6100 Prättigau, Suisse.

[illegible]

SmofKabine® special EP: Lysine, arginine, glycine, histidine, séroline, leucine, méthionine, phénylalanine, proline, valine, threonine, tyrosine, tryptophane, valine, glycine, glucose, huile de sésame raffinée, triglycérides à chaîne moyenne, huile de raffinée, huile de poisson). Pour une alimentation par gavage chez les patients adultes: [20] Dépend de l'état clinique des patients et du poids corporel. Dose maximale 3ml par kg de PC par jour en administration veineuse centrale (CVC) ou sous-cutanée (SC) 2 fois par jour, de préférence sous surveillance de la glycémie. L'ajout d'insuline est nécessaire en cas d'insuffisance hépatique sévère, troubles graves de la coagulation sanguine (hépatite chronique, cirrhose, ou métastases de cancer), insuffisance rénale, troubles graves sans possibilité d'hémofiltration ou de dialyse, choc, augmentation de la perméabilité intestinale, Prudence en cas d'insuffisance du métabolisme lipidique, insuffisance rénale, diacétate lactique, dysrégulation cellulaire, insuffisance, augmentation de l'oséonémie sérique, pas être administrer en même temps que des produits sanguins, pas être donné chez les nouveau-nés et les enfants en bas âge de moins de 2 ans. L'insuline hépatique, dérivée de la Cœurmine, peut gêner l'augmentation de la température corporelle. Poche et bouchon compartiments de 4 x102 ml et 4 x158 ml. Coût de revient: 4,60 Euro. Informations professionnelles complètes est publiée sur www.smedinfo.ch [21] Fresenius KaBi (Schweiz) AG, Arm. 10/2010 Kriessens

SMOPHID[®] : Huile de poisson, huile d'huile de poisson / Pour couvrir les besoins énergétiques et les besoins en acides gras essentiels, ainsi que pour la supplémentation en acides gras oméga-3 chez les patients dans le cadre de l'alimentation parentérale E. Adultes (10-20 g de lipides/kg/jour) Enfants et adolescents à partir de 6 ans: 3 g de lipides/kg/jour Nourissons: 1-5 g de lipides/kg/jour Dose initiale 0,5-10 g de lipides/kg/jour suivie par une augmentation progressive jusqu'à 10 g de lipides/kg/jour. Le Cholestérol est administré sous forme d'émulsion avec des huiles végétales ou animales. Indications: hypophosphémie sévère, insuffisance hépatique sévère, troubles graves de la coagulation sanguine, insuffisance rénale sévère, hyperphosphatémie sévère, insuffisance respiratoire sévère, troubles graves de la coagulation sanguine, insuffisance rénale sévère, possibilité d'hémolyse ou de dialyse, choc aigu. MCP Prudence en cas de métabolisme lipidique altéré, pnc rénal, insuffisance rénale, diabète décompensé, pancréatite, fonction hépatique altérée, hypothyroïdisme (en cas d'hypertension artérielle). Contre-indication: Prudence particulière chez les patients ayant un risque élevé d'hémolyse. Prudence chez les nouveau-nés prématurés et les enfants souffrant d'hyperlipidémie familiale. Précautions: Prudence chez les personnes atteintes d'hypertension artérielle ou d'hypertension pulmonaire. HA Bépanène[®] Légère élévation de la température corporelle, frissons, maux de tête, nausées, vomissements. F Flacons de 100 ml et 250 ml. Catégorie de vente pharmaceutique professionnelle consultable sur www.smedicon.fr. TA Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Am Matten 4, 6400 Kriens.

Solvant: N°1 Monoréacteur de thiamine (vit. B1), riboflavine phosphatée de sodium (vit. B2), chlorure de pyridoxine (vit. B6), nicotinamide (vit. B3), pantothénate de sodium, nicotinamide bionine, acide folique, ascorbate de sodium (vit. C) [Composé appartenant dans le cadre de l'alimentation parentérale afin de couvrir les besoins physiologiques en vitamines hydrosolubles].
Adjuvant: Les enfants de plus de 10 kg de PC1, l'ampoule par jour. Enfants de moins de 10 kg, 10 mg d'ampoule/jour. PC1 hypersensible à la pénicilline.
Contenants: Les composants MCP ne doit pas être administré non dilué. A Phénylthio, L-Dopa. B Réactions allergiques. C P1 ampoule.
 Catégorie de vente B. Information pharmacologique complète est publiée sur www.swissmedinfo.ch.
 Résensu K (Schweiz) AG, Unter Maltornstrasse 4, 6000 Kriens.

[illegible]

Les signes/noms avec ® sont des marques déposées du groupe Fresenius dans les pays sélectionnés.



FRESENIUS
KABI
caring for life

Fresenius Kabi (Schweiz) AG
Am Mattenhof 4, 6010 Kriens
www.fresenius-kabi.ch

Téléphone 041 552 70 00
InfoLine 800 800 877
InfoMail@fresenius-kabi.com



**FRESENIUS
KABI**
caring for life

Aperçu des produits

Nutrition parentérale

SmofKabiven 1600 kcal
Emulsion zur Infusion
Emulsion pour perfusion
1477 ml
Zur parenteralen Ernährung
pour nutrition par voie centrale

A close-up photograph of a woman's face in profile as she looks down at a medical drip chamber. The drip chamber has a vertical scale with numbers 100, 750, 500, and 250. To the left of the scale are several small boxes containing text in German, likely instructions or warnings. The woman is wearing a white lab coat.



A collection of various pharmaceutical products including vials, ampoules, and bottles of different sizes and shapes, some with labels and some without. The products are arranged in a row, showing a variety of packaging designs and colors. Some have detailed labels with text and logos, while others are plain or have minimal labeling. The background is a neutral, light color.

Emulsions lipidiques

Acides aminés

Additifs

		SMOFlipid®	Omegaven®	Aminoven® 10%	Aminoven® 15%	Aminoven® infant 10%	Dipeptiven®	Addaven®	Soluvit® N	Vitalipid® N Adult	Vitalipid® N Infant	Peditrace®	Glycophos®	
														
		Emulsions lipidiques		Standard		Spéciaux		'Détails par ampoule						
Volumes		100/*250 ml	100 ml	500 ml	250/*500 ml	100/*1000 ml	100 ml	10 ml	10 ml	10 ml	10 ml	10 ml	20 ml	Volumes
Description		Emulsion lipidique à base d'huile de soja, de TCM, d'huiles d'olive et de poisson; avec des acides gras ω-3 (EPA/DHA); pour les adultes et en pédiatrie	Emulsion lipidique à base d'huile de poisson, comme additif à teneur élevée en acides gras ω-3 (EPA/DHA)	Soluté d'acides aminés, sans électrolytes, avec de la taurine	Soluté d'acides aminés, sans électrolytes, avec de la taurine	Soluté d'acides aminés sans électrolytes, destiné à la nutrition parentérale en pédiatrie	Concentré de dipeptide alanyl-glutamine. 100 ml de Dipeptiven® contiennent 13.46 g de glutamine	Soluté d'oligo-éléments, complément de perfusion, destiné à la nutrition parentérale pour adultes	Vitamines hydro-solubles lyophilisées, complément de perfusion destiné à la nutrition parentérale pour adultes et en pédiatrie	Vitamines liposolubles, complément de perfusion destiné à la nutrition parentérale pour adultes	Vitamines liposolubles, complément de perfusion destiné à la nutrition parentérale en pédiatrie	Soluté d'oligoéléments, complément de perfusion, destiné à la nutrition parentérale en pédiatrie	Phosphate organique, complément de perfusion, destiné à la nutrition parentérale	Description
Composition		Energie totale 2000 kcal /l	Energie totale 1120 kcal /l	Energie totale 400 kcal /l	Energie totale 600 kcal /l	Energie totale 400 kcal /l	Energie totale 80 kcal/100 ml	Cuivre 380 µg	Vitamine B ₁ 2.5 mg	Vitamine A Palmitate de rétinol 990 µg	Vitamine A Palmitate de rétinol 690 µg	Cuivre 200 µg	Glycérophosphate 20 mmol	
		Huile de poisson 30 g/l EPA/DHA	Huile de poisson 100 g/l EPA/DHA	Acides aminés 100 g/l	Acides aminés 150 g/l	Acides aminés 100 g/l	Glutamine 13.46 g/100 ml	Manganèse 55 µg	Vitamine B ₂ 3.6 mg	Vitamine D ₂ Ergocalciférol 5 µg	Vitamine D ₂ Ergocalciférol 10 µg	Manganèse 10 µg	Sodium 40 mmol	
		Glycérol 25 g/l	Glycérol 25 g/l	Azote 16.2 g/l	Azote 25.7 g/l	Azote 14.9 g/l	Alanin 8.2 g/100 ml	Sélénium 79 µg	Vitamine B ₆ 4 mg	Vitamine E α-tocophérol 9.1 mg	Vitamine E α-tocophérol 6.4 mg	Sélénium 20 µg		
		Phospholipides d'œuf 12 g/l	Phospholipides d'œuf 12 g/l					Zinc 5 mg	Vitamine B ₁₂ 5 µg	Vitamine K ₁ Phytoménadione 150 µg	Vitamine K ₁ Phytoménadione 200 µg	Zinc 2.5 mg		
		Huile de soja 60 g/l						Fluor 950 µg	Acide pantothénique 15 mg			Fluor 570 µg		
		TCM 60 g/l						Iode 130 µg	Vitamine B ₃ 40 mg			Iode 9.85 µg		
		Huile d'olive 50 g/l						Chrome 10.0 µg	Biotine 60 µg					
		α-tocophérol 163 - 225 mg/l						Fer 1.1 mg	Acide folique 400 µg					
								Molybdène 19.0 µg	Vitamine C 100 mg					
pH							5.4 - 6.0	2.3 - 2.8	5.8	8	8	2	7.4	pH
Unité de commande		10	10	10	10	10 * ₆	10	20	10	10	10	10	10	Unité de commande
N° d'article		2678031 *2678061	1452031	3461091	3879061 *3460091	1475031 *1475141	1138031	ZYA1931	830976201	831008201	831016201	ZYV1981	ZYV1963	N° d'article
Pharmacode		3327405 *3327411	2838888	2837877	6249479 *2837908	2837937 *4256392	2340740	6308503	1083040	1391988	1139711	1580229	2647303	Pharmacode
Informations de commande														Informations de commande

Grâce à des produits et des concepts novateurs en **nutrition clinique**, nous nous engageons tous les jours en faveur de **l'amélioration de la qualité de vie des patients en phase aiguë et des patients chroniques** hospitalisés, institutionnalisés ou traités à domicile.



Service HomeCare pour la nutrition clinique ambulatoire

La planification, l'organisation et la réalisation d'une nutrition clinique - parentérale ou entérale - ambulatoire, à domicile est un service gratuit proposé par le service HomeCare.

L'équipe FresuCare est composée de personnel infirmier diplômé avec des formations complémentaires (p. ex. soins intensifs, soins oncologiques) soutenu par des diététiciens et des professionnels de la pharmacie.

Le service FresuCare est reconnu par la SSNC et la SVK et répond aux directives de la SSNC pour les HomeCares.

► Renseignements sur la nutrition clinique

InfoLine (gratuit) 0800 800 877
InfoMail@fresenius-kabi.com

► Pour votre commande

Pour les hôpitaux, les cabinets médicaux et les pharmacies
Téléphone gratuit 0800 820 280
Téléfax 0800 820 281
customerservice.ch@fresenius-kabi.com

Horaires d'ouverture du lundi au vendredi
08h00 à 12h00 / 13h00 à 17h00

Pour les patients à domicile et les établissements médico-sociaux

Téléphone gratuit 0800 820 290
Téléfax 0800 820 291
homecare.ch@fresenius-kabi.com

Horaires d'ouverture du lundi au vendredi
07h45 à 17h30